



Circumcisie

Circumcisie



Inleiding

Een ziekenhuisopname is voor een kind en z'n familie een ingrijpende gebeurtenis. Het kan zowel bij u als bij uw kind veel vragen oproepen. Daarom stelden we dit boekje op om u te begeleiden bij de voorbereidingen van de opname en te vertellen wat u zoal kan verwachten.

Hopelijk kan dit boekje u voldoende informeren. We streven er dan ook naar om de opnameperiode zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust.

We wensen u en uw kind een zo aangenaam mogelijk verblijf toe.

Wat is een circumcisie?

Een circumcisie of besnijdenis is een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de voorhuid waardoor de eikel gedeeltelijk of geheel ontbloot blijft.

Een circumcisie wordt uitgevoerd ter behandeling van phimosis (ver nauwing van de opening van de voorhuid van de penis) of vanuit godsdienstige / hygiënische overwegingen.

Vorbereiding thuis

Door een ziekenhuisopname komen kinderen vanuit hun vertrouwde omgeving in een, voor hen, onbekende omgeving terecht. Dit kan beangstigend zijn omdat

uw kind te maken krijgt met prikjes, onderzoeken en onbekende personen in witte schorten die gedurende de opname voortdurend in zijn omgeving zijn. Hierdoor kan uw kind uit zijn evenwicht raken. Belangrijk is om vooraf te vertellen wat en waarom iets gebeurt, zodat uw kind het gemakkelijker kan plaats en verwerken.

Een jong kind heeft vaak genoeg aan een eenvoudige uitleg, een ouder kind wil meestal al meer weten.

Om een indruk van onze afdeling te krijgen, kunt u, vrijblijvend, vóór de opname samen met uw kind een kijkje komen nemen op onze kinderafdeling. Als uw kind de sfeer van de afdeling ervaart, kan dit iets van zijn onzekerheid wegnemen.

Als ouder moet u rekening houden met volgende aandachtspunten:

- De dag van de operatie moet uw kind **nuchter** zijn, d.w.z. niets eten noch drinken vanaf middernacht. Baby's mogen 6 uur voor de opname nog hun flesje drinken. Als u verneemt van uw arts dat uw kind in de namiddag wordt geopereerd, volg dan zijn advies op wanneer uw kind ten laatste iets mag eten en drinken.
- **Juwelen** laat u beter thuis.
- **Nagellak** moet thuis verwijderd worden.

- Mocht uw kind de dag voor aanvang van de operatie **ziek** of verkouden (koorts of hoesten of neusloop, enz.), neemt u best contact op met uw arts en laat u uw kind onderzoeken bij uw kinder-/huisarts.
- U **brenkt** best volgende dingen **mee**:
 - Fopspeen en/of knuffel
 - Identiteitskaart en/of ISI-kaart (blauw kaartje van het ziekenfonds) van uw kind
 - Eventuele resultaten van onderzoeken
 - Flesvoeding bij baby's voor na de ingreep
- Het is handig als u reeds vooraf **pijnstilling** haalt in de apotheek. Hetzij paracetamol en/of ibuprofen, of volg hierbij het voorschrift van uw arts.
- Het ziekenhuis is vrij toegankelijk, laat daarom **waardevolle bezittingen** en grote geldbedragen thuis of laat ze niet onbeheerd achter. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Opname

Bij aankomst in het ziekenhuis dient u uw kind eerst in te schrijven aan de opnamedienst voor een dagopname. Men zal de identiteitskaart of ISI-kaart van uw kind vragen. Na de inschrijving komt u samen met uw kind naar de kinderafdeling.

Laat waardevolle bezittingen en grote geldbedragen thuis of laat ze niet onbeheerd achter.

Vorbereiding op de ingreep

- Uw kind wordt gewogen, gemeten en de temperatuur wordt gecontroleerd.
- U wordt met uw kind in de kamer geïnstalleerd, waar uw kind een operatiehemd en een armbandje aan krijgt.
- Tot aan het tijdstip van de operatie kan uw kind spelen in de speelkamer onder uw toezicht. Het tijdstip waarop uw kind geopereerd wordt, hangt af van het operatieschema, hierdoor kan het zijn dat u nog moet wachten vooraleer uw kind aan de beurt is.
- Uw kind wordt voorbereid aan de hand van het fotoverhaal 'Louise gaat naar het ziekenhuis'. U kan dit verhaal reeds vooraf raadplegen op onze website www.azzeno.be > diensten > pediatrie

Circumcisie



Naar de operatiekamer

De dokter verwittigt wanneer we uw kind naar de operatiekamer mogen brengen. Eén ouder mag het kind begeleiden tot in de operatiekamer tot het kind slaapt. Zwangere mama's worden niet toegelaten in de operatiekamer, noch in de ontwaakzaal.

Wat kan u als ouder verwachten als uw kind in slaap wordt gedaan?

U wordt opgewacht door een operatieverpleegkundige of vrijwilligster die u een blauwe overjas en muts geeft, zodat u uw kind kan begeleiden tot in de operatiezaal. Als uw kind op de operatietafel gelegd wordt, kan u naast uw kind staan om hem/haar te troosten. Omdat het kouder is in de operatiezaal, wordt uw kind bedekt met een verwarmd deken. D.m.v. 3 klevertjes op de borstkas kan men tijdens de operatie het hartritme controleren.

Kleine kinderen (< 6j) worden steeds in slaap gedaan met een maskertje. Er wordt indien mogelijk gevraagd aan het kind om te blazen in het maskertje of om de ballon op te blazen. Het is mogelijk dat uw kind wat onrustig wordt of begint te wenen vooraleer hij/zij in slaap valt.

Bij oudere kinderen (vanaf 6j) beslist de slaapdokter of het kind in slaap gaat d.m.v. een masker of een prikje (afhankelijk van leeftijd, gewicht, soort operatie). Uw

kind krijgt uit voorzorg vooraf reeds een toverpleister, zodat hij/zij het prikje niet zo goed voelt.

Als uw kind slaapt, wordt u door de verpleegkundige of vrijwilligster uit de operatiezaal geleid.

Tijdens de operatie

Het is als ouder niet toegestaan om de operatie van uw kind bij te wonen. U kunt wachten in de wachtzaal van het operatiekwartier, in de kamer van uw kind of in de ouderruimte. Op de kinderafdeling wordt u iets aangeboden om te drinken. Van zodra de operatie voorbij is, wordt u verwittigd en kan u bij uw kind blijven in de ontwaakkamer.

In de ontwaakkamer

Uw kind wordt in de ontwaakkamer nauwlettend in de gaten gehouden. Het is niet ongewoon dat uw kind aanvankelijk erg onrustig en ontroostbaar is. Dit komt doordat het kind nog niet wakker is en de verdoving nog aan het uitwerken is. Indien uw kind pijn aangeeft, kan er in de ontwaakkamer in samenspraak met de anesthesist of slaapdokter nog extra pijnstilling gegeven worden. Men informeert uw kind zodra mogelijk waarom hij/zij een infuus, verband, of andere slangetjes heeft.

Eén ouder mag het kind begeleiden tot in de operatiekamer tot het kind slaapt.

De anesthesist beslist wanneer uw kind voldoende wakker is om terug naar de kinderafdeling te gaan.

Terug op de kinderafdeling

Uw kind kan nog *slaperig* zijn bij aankomst op de kinderafdeling. Een dutje doet wonderen...

Mocht uw kind *pijn* aangeven, kan in overleg met de verpleegkundige nog pijnstilling gegeven worden op voorschrift van de anesthesist.

De slaapdokter bepaalt wanneer uw kind iets mag drinken en eten. De verpleegkundige brengt iets van zodra dit mag. Mogen wij u dan ook vragen om vooraleer voeding van thuis te geven, dit na te vragen bij de verpleegkundige. Indien uw kind een infuus heeft, wordt dit pas verwijderd als:

- uw kind voldoende gedronken en gegeten heeft
- uw kind geplast heeft (wat noodzakelijk



is voordat uw kind het ziekenhuis mag verlaten)

- er geen pijnstilling meer gegeven moet worden via het infuus.

Als uw kind voldoende hersteld is van de ingreep kan hij/zij nog wat spelen in de speelkamer.

Na toestemming en advies van de arts mag uw kind naar huis. Verzekeringpapieren, briefje sociaal verlof, attesten voor school en sport e.d. moeten door de arts worden ingevuld.

Houd rekening dat u voor een ingreep een ganse dag voorbehoudt. Als u toch vroegtijdig het ziekenhuis kan verlaten, is dit mooi meegenomen.

Circumcisie

Waar moet u thuis nog rekening mee houden?

- De dag van de ingreep is het wenselijk dat uw kind lichtverteerbare voeding eet, omdat de verdoving maaglast kan veroorzaken.
- Losse kledij is minst pijnlijk voor uw kind.
- De draadjes verdwijnen spontaan. Hiervoor houdt u deze best zo droog en zo proper mogelijk. Uw kind mag wel kort douchen.
- Indien er een kleefpleister of verband is aangebracht, zal de arts de nazorg toelichten.
- U brengt op voorschrift van de arts 2x/dag Terra-Cortrilzalf of suspensie aan op de hechtingen. Hiervoor trekt u de voorhud naar achter, tot de hechtingen zichtbaar zijn. Nadien trekt u de voorhud terug naar voor.
- Baden in zee of in een zwembad wordt afgeraden gedurende de eerste 3 weken omwille van infectiegevaar.
- Een circumcisie is een ingreep waarbij de glans van de plasser nadien nog enkele dagen gevoelig kan zijn. U mag uw kind dan ook regelmatig een pijnstiller geven. Hiervoor kan ibuprofen afgewisseld worden met paracetamol (eventueel tot max. om de 4u). Geeft u dezelfde medicatie, dan volgt u het advies op de verpakking.

Wanneer een arts contacteren?

- Achteruitgaan van de algemene toestand van uw kind.
- Zwelling, koorts en toenemende pijn.
- Als uw kind weigert om te plassen.
- Bij bloeding.

Meer info?

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, kan u contact opnemen met de kinderafdeling.

Urologen:

dr. W. Kerckhaert
dr. Z. Malikzada

Hoofdverpleegkundige:

Pauwaert Vicky



campus Knokke-Heist (8300)

Kalvekeetdijk 260 - T +32 (0)50 535 000

campus Blankenberge (8370)

Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000

campus Maldegem (9990)

Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 404 070